



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

Mycena olivaceomarginata (Mass.) Mass.

Nom français : Mycène à arête olivâtre

Dans les pelouses moussues. Chapeau de couleurs très variables, brun, brun grisâtre, brun jaunâtre, jaune orangé à olivacé, parfois rosâtre ou rougeâtre, marge plus pâle. Lames blanchâtres, arête brun olivacé. Stipe subconcolore au chapeau. Spores 9,5-13 x 4,5-7 µm. Cheilocystides fusiformes, ventrues, plus ou moins digitées au sommet. Pleurocystides absentes.



A noter l'existence de quelques espèces plus ou moins ressemblantes :

- *M. aurantiistipitata* (à rechercher dans notre région ?) : espèce sosie, méditerranéenne, pleurocystides filiformes ;
- *M. thymicola* : cheilocystides clavées à subcylindriques non ramifiées ;
- *M. roseofusca* (syn. *M. avenacea* var. *roseofusca*) : chapeau gris rosâtre à brun-pourpre, arête des lames rose crème, odeur alcaline à raphanoïde.

Espèce assez bien caractérisée et fréquente dans les milieux herbeux, nous la rencontrons de l'été à l'hiver, sur le littoral et à l'intérieur des terres.

Biblio : littérature courante - *Mycena* d'Europa G. Robich.





cheilos



