



Ordre : *Boletales*

Famille : *Sclerodermataceae*

## ***Scleroderma areolatum*** Ehrenb.

Nom français : Scléroderme aréolé

En forêt, lisière. Basidiome d'abord crème jaunâtre, présentant rapidement un périidium fissuré en petites écailles brunes et régulières (souvent délimitées par une fine ligne formant des aréoles), qui laissent nettement apparaître le fond pâle. Pseudostipe généralement peu développé. Spores (9)10,5-14  $\mu\text{m}$  avec des épines coniques 1-2(2,5)  $\mu\text{m}$ . A comparer surtout avec *S. verrucosum* : brun violacé, lisse au début, montrant ensuite des écailles moins contrastées et moins régulières et non entourées par une aréole ; pseudostipe souvent nettement développé ; spores plus petites 7-11  $\mu\text{m}$  avec épines ne dépassant pas 1,5  $\mu\text{m}$ .

Ce scléroderme n'est pas rare sur nos secteurs de prospection, il est visible chaque année, parfois dès le mois de juin, puis l'été et l'automne.

Biblio : littérature courante - Gastéromycètes épigés d'Europe, édit. 2003, FAMM.

*Fiche réalisée en décembre 2016 par Patrice TANCHAUD*



