



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius eucaeruleus Henry

Synonyme probable : *C. terpsichores* var. *calosporus*

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, bleu violacé saturé et persistant, décolorant légèrement en ochracé avec l'âge à partir du centre. Lames longtemps bleu violacé, puis finalement ochracé rouillé. Stipe blanc bleuté avec un bulbe marginé, voile bleu violacé. Chair blanchâtre à grisâtre bleuté. Odeur légèrement caoutchoutée, saveur douce. KOH nul sur cuticule et chair. Spores 9,5-12 x 5-7 µm.

S'il est un genre où il est difficile de nommer une récolte avec un nom qui fait l'unanimité chez les auteurs, c'est bien celui-ci, et ce groupe de cortinaires bleu-violacé ne déroge pas à la règle, il est infernal tant les interprétations sont différentes d'un ouvrage à un autre. Nous suivons donc l'avis éclairé de M. Guillaume Eyssartier (cf. GEPR), qui, sans entrer dans les détails, nous permet d'y voir un peu plus clair sur les noms à adopter aujourd'hui.

A comparer avec *C. terpsichores* et *C. vaginatopus*.

Ce cortinaire nous semble peu fréquent, notre récolte a été réalisée en novembre 2010, sous charmes et chênes, dans les bois de St Sornin.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR p. 732.