



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

## *Cortinarius splendens* R. Henry

Nom français : Cortinaire splendide

Surtout sous hêtres sur sol calcaire. Chapeau visqueux, jaune vif et intense, centre un peu ochracé roussâtre. Lames jaune vif persistant, fauve orangé ensuite. Stipe concolore au chapeau, avec un bulbe marginé ; cortine et mycélium jaunes. Chair jaune vif, odeur et saveur sans particularité. KOH olive sur cuticule, subnul à brunâtre sur chair. Spores 9,5-11,5 x 5,5-6 µm. A comparer avec :

- *C. splendentium* : surtout sous chênes et charmes, KOH purpurin sur cuticule ;
- *C. meinhardii* : sous conifères, plus grand, chapeau devenant plus sombre, chair jaune-vert soufré, odeur poivrée, KOH olive sur cuticule ;
- *C. citrinus* : sous hêtres, chapeau jaune-vert à gris olivacé, chair jaune-vert moins intense, KOH vert olivâtre sur cuticule et chair ;
- *C. citrinovirens* : sous feuillus calcicoles, grosse espèce aux teintes citrin verdâtre, KOH olivâtre roussâtre sur cuticule, olivâtre sur chair.

Ce cortinaire n'est pas fréquent dans notre région, il apparaît occasionnellement l'automne sous son essence de prédilection.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR p. 748.