



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius cf. depressus Fr.

Surtout sous pins, parfois sous épicéas. Chapeau souvent mamelonné, luisant, hygrophane, châtain obscur à brun noirâtre, puis brun clair, voile blanchâtre fugace vers la marge. Lames jaune ochracé à brun argilacé. Stipe blanc puis brunâtre, plus ou moins voilé de blanc, pouvant former des chevrons étagés ou une zone annuliforme. Chair brune. Odeur et saveur sans particularité. KOH ou NH₃ noir violacé sur la cuticule. Spores 8-11 x 5-6,5 µm selon l'ADC, 6,5-7,5 x 3,5-4,5 µm selon la FP.

Notre récolte a été réalisée dans un milieu planté en ville, à Saintes, avec peupliers et pins sylvestres pour seules essences. Nous émettons quelques réserves quant au binôme adopté, d'une part les espèces de la Section *Uracei*, où il se situe, peuvent paraître délicates à séparer ; d'autre part les divergences dans la littérature sur les dimensions sporales posent question, les nôtres mesuraient 8,5-9,5 x 5,5 µm.

Biblio : ADC Bidaud et al. - Flora photographica.

Fiche réalisée en septembre 2016 par Patrice TANCHAUD