



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius vaginatopus Bidaud, P. Moëgne-Loccoz, Reumaux

Synonyme : *C. volvatus* ss. auct.

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau peu visqueux, bleu-violet à violet brunâtre ou rougeâtre, marqué de vergetures ou de taches sombres innées et de plaques de voile blanc vers le centre. Lames bleutées à gris rosâtre, puis rouillées. Stipe violacé bleuâtre avec un bulbe marginé typiquement enveloppé de voile blanc. Chair blanchâtre bleuté. Odeur fruitée, saveur douce. KOH nul à faible et sans particularité. Spores 8-10,5 x 4,5-6 µm.

A comparer avec quelques espèces de la même Section *Caerulescentes* :

- *C. moenne-locozi* : sous feuillus à tendance non calcaire, chair jaune orangé pâle (peut-être synonyme ?) ;
- *C. terpsichores* et *C. eucaeruleus* : chapeau non ou peu vergeté et non taché, bulbe non volviforme.

A ce jour, nos récoltes de cette belle espèce proviennent de Saintes et Trizay, toutes réalisées lors des mois d'octobre et de novembre.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR p. 730.

