



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

## *Cortinarius conicosordescens* A. Favre

Sous bouleaux. Chapeau beige roussâtre, non hygrophane, nettement mamelonné, maculé de taches radiales sombres à maturité, marge pourvue de voile blanc dans la jeunesse. Lames brunâtres puis brun rouillé. Stipe assez long, ochracé sous le voile et les fibrilles blanchâtres. Chair brunâtre, odeur et saveur faibles, herbacées à raphanoïdes. KOH gris-brun sombre sur la cuticule et gris brunâtre sur la chair. Spores 8,5-11 x 5-6,5 µm.

Avec une écologie similaire, ce cortinaire de la section *Sericeocybe*, série *Sordescens*, est à comparer avec :

- *C. subferrugineoides* : chapeau hygrophane (cf. cette fiche) ;
- *C. suillo-clarus* : non hygrophane, chapeau beige pâle et stipe court.

Nous avons une récolte qui semble pouvoir se rattacher à ce taxon, réalisée en compagnie de notre ami Robert Lagarde, en novembre 2015, sous bouleaux en milieu humide, en forêt de Brigueuil (16). Les spores contrôlées mesuraient 10-10,5 x 5,5-6,5 µm.

Biblio : Bull. FMBDS n° 186, p. 13-17 (2007).

*Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD*