



Ordre : *Boletales*

Famille : *Rhizopogonaceae*

## *Rhizopogon roseolus* Fr. & Nordholm

Sous conifères. Fructification globuleuse à subglobuleuse, blanche dans la jeunesse, puis ochracé jaune à rose rouge, rares cordons mycéliens enveloppant le péridium, jaunit et rosit au frottement, KOH rose rouge. Spores 6-8 x 2,5-4  $\mu\text{m}$  non tronquées, basides à parois épaisses. A comparer avec des taxons ressemblants :

- *R. evadens* : rhizomorphes rares, rose rouge au froter et au KOH, spores non tronquées à subtronquées, basides à parois minces ;
- *R. marchii* : rhizomorphes rares, brun incarnat au froter et au KOH, spores ovoïdes, basides à parois épaisses ;
- *R. abietis* : rhizomorphes rares, rose rouge au froter et au KOH, spores tronquées, basides à parois épaisses ;
- *R. aromaticus* (uniquement méditerranéen ?) : rhizomorphes rares, odeur fruitée à maturité, rose rouge au froter et au KOH, spores non tronquées ;
- *R. luteolus* (cf. cette fiche) et *R. occidentalis* : rhizomorphes présents.

Ce *Rhizopogon* semble assez fréquent sur nos lieux de prospection, notamment sur le littoral. Il est bien évident qu'un contrôle microscopique est plus qu'indispensable avec toutes ces espèces plus que similaires.

Biblio : littérature courante -The genus *Rhizopogon* in Europe Maria Paz Martin - GEPR p. 1046.